



# Amserlen frechu COVID-19

Unigolion nad ydynt yn wynebu risg uwch o glefyd difrifol o haint COVID-19

Oed (blynnyddoedd)	0-11	12-15	16-17	18-39	40+
<b>Prif gwrs</b> 	Nid yw brechu'n cael ei argymhell ar hyn o bryd	<b>2 ddos</b> Pfizer BioNTech (Comirnaty®) >Bwlch o 12 wythnos <sup>4</sup>	<b>2 ddos</b> Pfizer (Comirnaty®) or Moderna (Spikevax®) <sup>2</sup> bwlc o 8 wythnos	<b>2 ddos</b> Pfizer (Comirnaty®) Moderna (Spikevax®) <sup>2</sup> AstraZeneca (Vaxevria®) <sup>5</sup> bwlc o 8 wythnos	
<b>Brechlyn Atgyfnerthu</b> 		 <b>Na</b> Nid yw'r pigiad atgyfnerthu yn cael ei argymhell		 <b>Ie</b> Pfizer BioNTech (Comirnaty®) Moderna (Spikevax®) <sup>2</sup> Bwlch o 3 mis o leiaf	
<b>Haint</b> 		Aros o leiaf <b>12 wythnos</b> rhwng haint COVID-19 a brechiad COVID-19%		Aros o leiaf <b>4 wythnos</b> rhwng haint COVID-19 a brechiad COVID-19	

Unigolion sydd yn wynebu risg uwch o glefyd difrifol o haint COVID-19\*

Oed (blynnyddoedd)	0-11	12-15	16-17	18-39	40+
<b>Prif gwrs</b> 	Nid yw brechu'n cael ei argymhell ar hyn o bryd	<b>2 ddos<sup>1</sup></b> Pfizer BioNTech (Comirnaty®) Bwlch o 12 wythnos	<b>2 ddos<sup>1</sup></b> Pfizer (Comirnaty®) or Moderna (Spikevax®) <sup>2</sup> bwlc o 8 wythnos	<b>2 ddos<sup>1</sup></b> Pfizer (Comirnaty®) Moderna (Spikevax®) <sup>2</sup> AstraZeneca (Vaxevria®) <sup>5</sup> bwlc o 8 wythnos	
<b>Brechlyn Atgyfnerthu</b> 		 <b>Na</b> Nid yw'r pigiad atgyfnerthu yn cael ei argymhell	 <b>Ie</b> Pfizer BioNTech (Comirnaty®) Bwlch o 3 mis o leiaf	 <b>Ie</b> Pfizer BioNTech (Comirnaty®) or Moderna (Spikevax®) <sup>2</sup> Bwlch o 3 mis o leiaf	
<b>Haint</b> 				Aros o leiaf <b>4 wythnos</b> rhwng haint COVID-19 a brechiad COVID-19	

<sup>1</sup>Cynghorir 3ydd dos os oedd y person yn ddifrifol imiwnoatiedig ar adeg y dos cyntaf neu'r ail ddos (edrychwch ar y Green Book am fanylion)

<sup>2</sup> Y dos cyntaf o Frechlyn COVID-19 Moderna Spikevax® yw 100 microgram (0.5mL), Y dos atgyfnerthu yw 50 microgram (0.25mL)

<sup>3</sup> Staff gofal iechyd, gofal cymdeithasol neu gartref gofal, grwpiau risg clinigol a'r rhai sy'n ddifrifol imiwnoatiedig neu bobl sy'n byw gyda nhw

<sup>4</sup> Gellir lleihau'r bwlc yma i 8 wythnos mewn cyfnodau o lefel uchel o achosion neu lle roedd pryder ynghylch effeithiolrwydd brechlyn.

<sup>5</sup> Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y dyli ddefnyddio Vaxevria



Mae hwn yn cael ei ddarparu fel canllaw gyda lluniau ac nid yw'n rhoi sylw i bob senario nac yn cymryd lle'r angen am asesiad clinigol nac yn disodli'r cyfarwyddyd yn y Green Book.

Green Book

Yn gywir ar 01/12/2021 Fersiwn 0e