

Data ac Ystadegau ar Ysmygu





GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

Yn y casgliad o sleidiau hwn, byddwn yn archwilio:


- **Cyfraddau ysmegu ymhlith oedolion yng Nghymru**
Tueddiadau dros amser
- **Cyfraddau ysmegu ymhlith plant a phobl ifanc**
Tueddiadau dros amser
- **Yr Effeithiau a'r baich ar iechyd ar Gymru**
- **Anghydraddoldebau a phatrymau economaidd-gymdeithasol**
- **Beth mae'r data'n ei awgrymu ar gyfer y dyfodol**

Ysmygu Tybaco ymhlith Oedolion yng Nghymru

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Cymru diweddaraf (2024-25), dywedodd 10.4% o oedolion (18 oed a hŷn) yng Nghymru eu bod yn ysmygu sigarêts ar hyn o bryd. Mae hwn yn llai nag yn 2022-23 (13%).

Dyma'r gyfradd ysmygu isaf ymhlith oedolion a gofnodwyd yng Nghymru ers dechrau cofnodi.

- Mae cyffredinrwydd ysmygu ar ei uchaf ymhlith oedolion 25–34 oed.
- O'i gymharu â 2011, mae ysmygu ymhlith oedolion yng Nghymru wedi gostwng mwy na 50%.
- Fodd bynnag, er bod y duedd ar i lawr yn parhau, **mae 1 o bob 10 oedolyn yng Nghymru yn dal i ysmygu.**



Prif ganlyniadau Arolwg Cenedlaethol Cymru: Ebrill 2024 i Fawrth 2025 [HTML] | LLYW.CYMRU

Ysmygu Tybaco ymhlith Pobl Ifanc yng Nghymru


Mae cyfraddau ysmygu ymhlith plant oedran ysgol yn isel iawn.

- Ym mlynnyddoedd 7–11 (11–16 oed): mae ~3% yn ysmygu sigarêts ar hyn o bryd.
- Ymhlith disgyblion hŷn (blynnyddoedd 12–13): mae ~7% yn nodi eu bod yn ysmygu ar hyn o bryd.

Mae cyfraddau "Wedi rhoi cynnig ar ysmygu" ychydig yn uwch, ond yn dal i fod o dan 10% ar gyfer y rhan fwyaf o ddisgyblion ysgol uwchradd.

Mae cyfraddau ysmygu rheolaidd ymhlith pobl ifanc yng Nghymru wedi bod yn gostwng yn gyson.


Defnyddiwch eich data y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion er mwyn pennu pa mor gyffredin yw ysmygu ymhlith eich dysgwyr a nodi unrhyw batrymau y gallai fod angen sylw arnynt.




Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru

Deall Tueddiadau Ysmygu Cyfredol

Bechgyn Blwyddyn 11 (Cymru): Tueddiadau Ysmygu a Fepio



Merched Blwyddyn 11 (Cymru): Tueddiadau Ysmygu a Fepio



Mae data SHRN yn dangos bod ysmygu rheolaidd ymhlith disgyblion Blwyddyn 11 yng Nghymru wedi parhau i ostwng rhwng 2017 a 2023.



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

Yr Effaith a'r Baich ar Iechyd yng Nghymru

Amcangyfrifir bod **3,845 o farwolaethau'r flwyddyn** yng Nghymru (ymysg pobl 35 oed a hŷn) o ganlyniad i ysmegu - dros **10% o'r holl farwolaethau** yn y grŵp oedran hwnnw. (Wedi'i gyfrifo rhwng 2020 a 2022)

Mae ysmegu hefyd yn cyfrannu at bwysau sylweddol ar wasanaethau iechyd: mae tua **17,000 o dderbyniadau i'r ysbyty bob blwyddyn** yng Nghymru o ganlyniad i ysmegu.


Nid yw baich marwolaeth a salwch wedi'i ddosbarthu'n gyfartal: mae pobl yn y **cymunedau mwyaf difreintiedig** yn dioddef llawer mwy - mae cyfraddau marwolaethau a derbyniadau i'r ysbyty sy'n gysylltiedig ag ysmegu tua **thair gwaith yn uwch** yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig nag yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig.

Anghydraddoldebau a Phatrymau Economaidd-gymdeithasol

Mae cysylltiad cryf rhwng amddifadedd ar lefel ardal a chyffredinrwydd ysmegu. Yng Nghymru, mae tua 22.4% o oedolion sy'n byw yn y cymdogaethau mwyaf difreintiedig yn ysmegu, o'i gymharu â dim ond 6.6% o'r rhai yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2023).

Yng Nghymru mae statws economaidd-gymdeithasol - gan gynnwys cyflogaeth a dosbarth galwedigaethol - hefyd yn bwysig. Mae cyfraddau ysmegu yn uwch ymhlith pobl mewn swyddi “gwaith ailadroddus â llaw” neu’r rhai sy’n ddi-waith, o’u cymharu â’r rhai mewn rolau rheoli neu broffesiynol.

Dosbarthiad ysmygwyr yng Nghymru 18 oed a hŷn yn ôl cymdogaeth



Ffynhonnell: Arolwg Blynnyddol o'r Boblogaeth gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol
Amddifadedd a'r effaith ar gyffredinrwydd ysmegu, Cymru a Lloegr: (2017 i 2021)

Crynodeb

Mae cyfraddau ysmegu yng Nghymru yn is nag erioed, gyda chyffredinrwydd isel ymhlith pobl ifanc, er bod ychydig dros 1 o bob 10 oedolyn yn dal i ysmegu.

Mae tueddiadau hirdymor yn dangos gostyngiad sylweddol a pharhaus mewn ysmegu ar draws pob grŵp oedran. Fodd bynnag, mae ysmegu yn parhau i fod yn brif achos salwch a marwolaethau y gellir eu hatal, gan gyfrannu at dros 10% o farwolaethau a phwysau sylweddol ar wasanaethau iechyd bob blwyddyn.

Nid yw baich ysmegu wedi'i ddosbarthu'n gyfartal, gyda chyfraddau ac effeithiau ar iechyd yn sylweddol uwch mewn cymunedau mwy difreintiedig. Er bod llawer o gynnydd wedi bod, mae lleihau anghydraddoldebau a chefnogi ysmygwyr mewn grwpiau difreintiedig, yn ogystal â mentrau i atal dechrau ysmegu, yn parhau i fod yn hanfodol er mwyn sicrhau gostyngiadau pellach mewn niwed.





GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

Cyfeiriadau

Cymerodd yr wybodaeth a ddarparwyd yn y set sleidiau hon gyfeiriadau o'r canlynol:

[Arolwg Cenedlaethol Cymru prif ganlyniadau: Ebrill 2024 i Fawrth 2025 \[HTML\] | LLYW.CYMRU](#)

<https://icc.gig.cymru/gwybodaeth-erthygl/gweithio-clwstwr-tystiolaeth/>

<https://rhwydwaithiechydcyhoeddus.cymru/mae-dros-10-y-cant-o-farwolaethau-yng-nghymru-oherwydd-smygu/>

[ASH \(Gweithredu ar Ysmygu ac Iechyd\)](#)

<https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/drugusealcoholandsmoking/bulletins/deprivationandtheimpactonsmokingprevalenceenglandandwales/2017to2021>