

Briff Polisi: Ymestyn Mangreoedd Di-fwg Presennol ac Arfaethedig yn Fannau Cyhoeddus Di-fêp yng Nghymru: Cyfleoedd trwy'r Ddeddf Tybaco a Fêps

Cyflwyniad

Mae'r deddfwriaeth ddi-fwg a roddwyd ar waith yng Nghymru ymhlith y mwyaf cynhwysfawr yn y Deyrnas Unedig, gan ymestyn amddiffyniadau rhag mwg ail-law y tu hwnt i weithleoedd a mannau cyhoeddus caeëdig i leoliadau a ddefnyddir gan blant, teuluoedd a'r cyhoedd ehangach. Mae hyn yn adlewyrchu newid mwy cyffredinol tuag at greu amgylcheddau lle mae bod yn ddi-fwg yn ddisgwyliad cymdeithasol ac y gall cenedlaethau'r dyfodol fyw yn rhydd rhag tybaco. Mae'r Ddeddf Tybaco a Fêps yn golygu y gellir ystyried ymestyn gofynion di-fêp i leoliadau cyhoeddus awyr agored ychwanegol. Mae hyn yn creu cyfle i Gymru gynnwys fepio mewn cyfyngiadau di-fwg presennol ac yn y dyfodol, yn enwedig mewn lleoliadau a ddefnyddir gan blant, pobl ifanc a grwpiau eraill a allai fod yn agored i niwed.

Nid yw deddfwriaeth ddi-fwg Cymru yn cynnwys gofynion di-fêp, ar hyn o bryd, gan adael i sefydliadau, tîrfeddianwyr a darparwyr gwasanaethau unigol benderfynu ble y caniateir fepio. Er bod fepio'n gallu helpu pobl i roi'r gorau i ysmegu a lleihau niwed ymhlith oedolion sy'n ysmegu, ceir pryderon o hyd ynglŷn â nifer y bobl ifanc sy'n dechrau fepio ac yn mynd yn ddibynnol ar nicotin, amlygiad ail-law i aerosol, normaleiddio defnyddio nicotin, a chydymffurfio â pholisïau di-fwg. Felly, mae'n rhaid i bolisi yn y dyfodol gydbwyso rôl fepio wrth leihau niwed ag amddiffyn grwpiau sy'n agored i niwed ac atal dechrau defnyddio nicotin a'i normaleiddio ymhlith plant a phobl ifanc.

Dylid darllen y briff hwn ochr yn ochr â briff polisi Iechyd Cyhoeddus Cymru (2026), Ymestyn Mannau Awyr Agored Di-fwg yng Nghymru: Cyfleoedd trwy'r Ddeddf Tybaco a Fêps. Mae'r briff cysylltiedig yn canolbwyntio ar y sail resymegol a'r dystiolaeth ynglŷn ag ymestyn gofynion di-fwg i leoliadau cyhoeddus awyr agored ychwanegol, tra bod y briff hwn yn archwilio'r achos dros gynnwys gofynion di-fêp o fewn amgylcheddau di-fwg presennol ac yn y dyfodol. Mae'n crynhoi'r dystiolaeth sydd ar gael ynglŷn ag effeithiau ar iechyd y cyhoedd, ystyriaethau gweithredu, goblygiadau tegwch ac opsiynau polisi sy'n gysylltiedig ag ymestyn gofynion di-fêp ar draws mannau cyhoeddus dan do ac awyr agored yng Nghymru. Ei ddiben yw cefnogi datblygu polisi wedi'i lywio gan dystiolaeth sy'n amddiffyn iechyd y boblogaeth ar yr un pryd â chynnal cymorth i roi'r gorau i ysmegu ac uchelgais hirdymor Cymru i gyflawni Cymru ddi-fwg erbyn 2030.

Trosolwg o'r ymchwil

Cynhaliodd Iechyd Cyhoeddus Cymru adolygiad cyflym o'r dystiolaeth ryngwladol ynglŷn â mannau cyhoeddus dan do ac awyr agored di-fêp yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst 2026. Asesodd yr adolygiad y sail resymegol dros ymestyn mesurau di-fwg presennol ac yn y dyfodol i gynnwys gofynion di-fêp yng Nghymru o safbwynt iechyd y cyhoedd, ac amlygodd ystyriaethau allweddol ar gyfer gweithredu. Mae'r sylfaen dystiolaeth yn esblygu a thyfu'n gyflym o ganlyniad i boblogrwydd cymharol ddiweddar fepio. Canolbwyntiodd yr adolygiad hwn ar gyfodol y dystiolaeth o 63 o brif astudiaethau a oedd yn cynnwys elfennau meintiol, ansoddol a dulliau cymysg, gan grynhoi'r dystiolaeth sydd ar gael i lywio datblygu polisi yn y dyfodol. Lle bo'n berthnasol drwyddo draw, cynhwyswyd enghreifftiau o astudiaethau a adolygwyd fel dyfyniadau ochr yn ochr â thystiolaeth ategol ehangach.

Sail resymegol a thystiolaeth

Mae deddfwriaeth ddi-fwg yn elfen graidd o fframwaith MPOWER Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) a Chonfensiwn Fframwaith Rheoli Tybaco (FCTC) yr WHO. Er nad yw'r FCTC yn ymdrin â sigarêts



electronig neu gynhyrchion nicotin eraill, yn benodol, mae Cynadleddau Partïon olynol wedi annog ystyried systemau electronig ar gyfer cyflenwi nicotin (ENDS), systemau electronig nad ydynt yn cyflenwi nicotin (ENNDS) a chynhyrchion nicotin newydd eraill o fewn polisi rheoli tybaco ehangach. Mae hyn yn cynnwys mesurau i gyfyngu ar ddefnydd mewn gweithleoedd a mannau cyhoeddus dan do, atal pobl ifanc rhag dechrau eu defnyddio a lleihau'r posibilrwydd o ailnormaleiddio defnyddio nicotin ^[1,2,3,4,5,6,7].

Mae'r cyfeiriad hwn yn cael ei adlewyrchu'n gynyddol ledled y Deyrnas Unedig trwy gynigion ar gyfer mannau cyhoeddus di-fêp, Fframwaith Tybaco a Fepio yr Alban, a safbwyntiau a fabwysiadwyd gan gyrff iechyd y cyhoedd a phroffesiynol ^[8,9,10]. Yn yr un modd, mae Datganiad Sefyllfa ar Fêps (e-sigarêts) Iechyd Cyhoeddus Cymru (2026) yn argymhell dull cytbwys wedi'i seilio ar iechyd y boblogaeth, gan gydnabod rôl fepio wrth roi'r gorau i ysmegu ar yr un pryd ag amlygu pryderon ynglŷn â dibyniaeth ar nicotin, defnydd gan bobl ifanc, anghydraddoldebau iechyd ac effeithiau ar y boblogaeth ehangach ^[11].

Polisiâu dan do ac awyr agored di-fwg: Ceir enghreifftiau o'r polisiâu mwyaf blaengar yn yr Unol Daleithiau, yn bennaf, yn ogystal â Chanada, Awstralia, Seland Newydd, Gwlad Groeg, Norwy, Malta, Hwngari, Gwlad Pwyl, a Sbaen. Mae'r polisiâu a adolygwyd yn ymdrin â rhai neu bob un o'r lleoliadau canlynol: **Lleoliadau Addysgol** (gan gynnwys mannau dan do a thiroedd awyr agored campysau prifysgolion ac ysgolion), **Lleoliadau a thiroedd gofal iechyd** (gan gynnwys ysbytai), **Lleoliadau Lletygarwch** (gan gynnwys bariau a bwytai y mae deddfau aer dan do di-fwg sy'n cynnwys e-sigarêts yn berthnasol iddynt), **Gweithleoedd** (gan gynnwys amgylcheddau gweithio cyhoeddus y mae deddfau aer dan do di-fwg sy'n cynnwys e-sigarêts yn berthnasol iddynt), **Amgylcheddau Manwerthu** (gan gynnwys siopau a strydoedd mawr), **Mannau Hamdden a Chymunedol** (gan gynnwys meysydd chwarae, parciau a chanol trefi), a **mannau cyhoeddus dan do ac awyr agored cyffredinol** lle na ddiffiniwyd lleoliadau ymhellach. Roedd lleoliadau nad oeddent yn hygyrch i'r cyhoedd, neu yr oedd cyfyngiadau'n berthnasol iddynt, yn bennaf, o fewn amgylcheddau byw preifat neu sefydliadol neu amgylcheddau gweithio nad ydynt yn gyhoeddus, wedi'u heithrio o'r adolygiad hwn (e.e., tai cymdeithasol, carchardai a lleoliadau gwarchodol, lleoliadau preswyl cleifion mewnol fel wardiau iechyd meddwl, ac amgylcheddau gweithio staff yn unig).

Buddion iechyd y cyhoedd: Ceir tystiolaeth gref a chyson bod deddfwriaeth ddi-fwg yn lleihau amlygiad i fwg ail-law ac yn gwella canlyniadau iechyd y cyhoedd, gan gynnwys llai o risg clefyd cardiofasgwlaidd ac anadlol, canlyniadau andwyol adeg geni, genedigaethau cyn amser, heintiau ar y system anadlu isaf a derbyn plant i'r ysbyty oherwydd asthma ^[12,13,14]. Mewn cyferbyniad, mae'r dystiolaeth ynglŷn ag effeithiau deddfwriaeth ddi-fêp yn fwy rhagarweiniol o hyd ac mae'n aml yn deillio o ddeddfwriaeth ddi-fwg ehangach (sydd fel arfer yn dileu hylوسي cynhyrchion fel sigarêts) neu fentrau di-dybaco (sydd fel arfer yn dileu defnyddio unrhyw gynnyrch sy'n cynnwys tybaco neu nicotin). Oherwydd hyn, mae'n fwy anodd pannu i ba raddau y gellir priodoli'r effeithiau a arsylwir yn benodol i reoliadau di-fêp o fewn y polisiâu hyn. Fodd bynnag, ceir nifer gynyddol o astudiaethau sydd wedi asesu canlyniadau sy'n gysylltiedig â fepio ar ôl cynnwys cynhyrchion fepio o fewn cyfyngiadau di-fwg a di-dybaco presennol. Amlinellir effeithiau'r astudiaethau hyn isod yn yr is-adrannau canlynol.

Effeithiau ymddygiadol: Mae'r dystiolaeth yn ymwneud â chyffredinrwydd ysmegu a fepio, gan amlaf, ond mae'r canfyddiadau'n gymysg. Lle cynhaliwyd sawl astudiaeth ar gampysau prifysgolion, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau, mae rhai astudiaethau wedi dangos bod polisiâu fepio cynhwysfawr ar gyfer y campws cyfan yn lleihau lefelau presennol o ysmegu a defnyddio tybaco a nicotin yn sylweddol, er bod mesurau'n tueddu i fod wedi'u seilio ar hunanadrodd a defnydd canfyddedig gan gyfoedion ^[15,16]. Mae'r rhan fwyaf o astudiaethau yn y lleoliadau hyn yn adrodd nad yw polisiâu'n cael unrhyw effaith ymddygiadol ^[17,18,19]. Mae effeithiau cyfyngiadau fepio dan do ar ddefnydd gan oedolion wedi

bod yn llai eglur hefyd, wrth i rai astudiaethau adrodd nad yw polisiâu rhanbarthol yn cael effeithiau arwyddocaol ar ymddygiad fepio, ysmegu, na rhoi'r gorau ^[20,21,22]. Yn bwysig, mae sawl astudiaeth yn adrodd am achosion helaeth o fepio llechwraidd ac effeithiau disodli posibl, gyda rhywfaint o orgyffyrddiad rhwng y ddau ^[23,24,25,26,27]. O ran y cyntaf, mae fepio llechwraidd yn ymwneud yn bennaf ag achosion posibl o dorri'r polisi, wrth i unigolion addasu eu hymddygiad i gelu defnydd neu barhau i fepio mewn lleoliadau lle y cyfyngir ar fepio neu lle na chaniateir fepio mwyach. Mewn un astudiaeth, roedd bron hanner y myfyrwyr a oedd yn defnyddio e-sigarêts wedi fepio'n llechwraidd ar gampws prifysgol di-dybaco, ac adroddodd y myfyrwyr hyn eu bod wedi'u defnyddio ar naw niwrnod ar gyfartaledd yn ystod y mis blaenorol ^[23]. Mae tebygolrwydd ac amllder uwch o fepio llechwraidd wedi cael eu cysylltu â dibyniaeth uwch ar nicotin ^[24]. Adroddodd myfyrwyr hefyd am addasu eu hymddygiad i osgoi cyfyngiadau polisi, er enghraifft trwy ddefnyddio dyfeisiau llai o faint ac e-hylifau arogl ysgafn/gwelededd isel ^[23].

O ran yr olaf, gellid adnabod effeithiau disodli fel canlyniadau anfwriadol cydymffurfio â pholisi, wrth i unigolion barhau i fepio ond gwneud hynny ar adegau ac mewn lleoliadau y tu allan i gyfyngiadau polisi diffiniedig neu barthau gorfodi. Mae tystiolaeth yn awgrymu y gallai'r addasiadau hyn danseilio effeithiolrwydd polisi trwy symud defnydd i leoliadau lle mae gorfodi'n llai tebygol o ddigwydd, fel ystafelloedd ymolchi, ystafelloedd aml-wely a llyfrgelloedd ^[23,24]. Adroddwyd am effeithiau disodli tebyg mewn mannau eraill, gan gynnwys symud gweithgarwch ysmegu neu fepio i ardaloedd yn union y tu allan i ffiniau polisi ^[25,26,27].

Mae nifer fach o astudiaethau wedi adrodd am ganlyniadau negyddol posibl polisiâu sy'n cyfyngu ar fepio ochr yn ochr ag ysmegu. Mae'r rhain yn cynnwys un astudiaeth lle'r oedd cyfyngiadau fepio dan do a weithredwyd trwy ddeddfau di-fwg mewn gweithleoedd, bwytai, a bariau yn gysylltiedig â mwy o gyfranogiad mewn ysmegu, mwy o ddefnydd o sigarêts, ac effeithiau cryfach ymhlith menywod beichiog iau, â llai o addysg ac a oedd yn cael eu hyswrio gan Medicaid ^[28]. Mae rhai astudiaethau ynglŷn â pholisiâu campws di-dybaco a oedd hefyd yn ddi-fêp wedi adrodd am gynnydd mewn fepio er gwaethaf effeithiau cadarnhaol neu ddim effeithiau ar roi'r gorau i ysmegu fel arall ^[19,29,30], er y gallai hyn hefyd adlewyrchu cynnydd ehangach mewn cyffredinrwydd fepio ^[31].

Effeithiau ar roi'r gorau i ysmegu: Nid yw'r rhan fwyaf o astudiaethau'n asesu rhoi'r gorau i ysmegu yn uniongyrchol. Yn ôl Arolwg Blynnyddol o'r Boblogaeth Oedolion ASH Cymru, mae 51% o bobl sy'n fepio yn dweud eu bod yn gwneud hynny i roi'r gorau i ysmegu neu ysmegu llai ^[32]. Yn aml, ystyrir bod fepio'n opsiwn cymharol fwy diogel nag ysmegu, gan ei fod yn lleihau amlygiad unigol i lefelau uchel o Nitrosaminau Penodol i Dybaco (gan gynnwys carsinogenau) ^[33], a thybir y gallai gael llai o effeithiau andwyol ar lif y gwaed a phwysedd gwaed ^[34], ac y gallai leihau risg profi symptomau anadlol o gymharu ag ysmegu ^[35]. Er bod treialon clinigol yn awgrymu bod fêps a ddarperir trwy wasanaethau rhoi'r gorau i ysmegu yn gallu gwella cyfraddau rhoi'r gorau ^[39], mae'r dystiolaeth o weithredu yn y byd go iawn yn gyfyngedig o hyd, ac nid oes dealltwriaeth dda eto o batrymau hirdymor defnyddio fêps ac ailddechrau ysmegu o gymharu â Therapi Disodli Nicotin (NRT) safonol.

Serch hynny, mae rhai astudiaethau wedi awgrymu y gallai polisiâu di-fêp danseilio defnyddio fêps fel offeryn pwysig i helpu i roi'r gorau i ysmegu i lawer o oedolion, er ei bod yn ymddangos bod yr awgrym hwn wedi'i seilio'n bennaf ar dybiaethau damcaniaethol yn hytrach na thystiolaeth uniongyrchol o effeithiau. Mae rhai awduron wedi awgrymu bod amgylcheddau di-fêp yn cosbi neu'n stigmatiddio ysmegwyr sy'n fepio yn annheg, gan leihau eu parodrwydd i roi'r gorau iddi a chyfrannu ymhellach at anghydraddoldebau iechyd sy'n gysylltiedig â pharhau i ysmegu, o bosibl ^[36,37]. Fe allai hyn fod yn arbennig o berthnasol yng Nghymru, lle mae oedolion sy'n byw yn y cymunedau mwyaf difreintiedig bron dair gwaith mor debygol o ysmegu na'r rhai yn y cymunedau lleiaf difreintiedig ^[38]. Yn yr un modd,

fe allai menywod beichiog – a allai fod yn arbennig o awyddus i roi'r gorau i ysmegu – ddefnyddio e-sigaréts i'w helpu i roi'r gorau i ysmegu yn ystod beichiogrwydd, sy'n golygu y gallai cyfyngiadau ar fepio, mewn rhai amgylchiadau, effeithio ar ymdrechion menywod beichiog i roi'r gorau i ysmegu, er bod y canfyddiadau'n gyfyngedig i un astudiaeth [28].

Amdiffyn plant a phobl ifanc: Ceir pryderon cynyddol bod y cynnydd cyflym yng nghyffredinrwydd fepio wedi cyfrannu at ailnormaleiddio defnyddio nicotin, yn enwedig ymhlith plant a phobl ifanc [40,41], gan felly gyflwyno her sylweddol i wasanaethau iechyd, addysg, ieuencid, a thrydydd sector ledled Cymru [41]. Mae rhai astudiaethau'n awgrymu bod pobl ifanc sy'n fepio'n fwy tebygol o ddechrau ysmegu, er bod dadleuon o hyd ynglŷn â natur a chyfeiriad y berthynas hon [42]. At hynny, mynegwyd pryderon y gallai plant a phobl ifanc fod yn arbennig o agored i effeithiau corfforol fepio, gan fod tystiolaeth yn awgrymu'n betrus y gallai defnyddio e-sigaréts achosi straen ocsidiol ac effeithio ar yr ymennydd sy'n datblygu [43]. Mae'r llenyddiaeth hefyd yn amlygu pwysigrwydd dylanwadau cymdeithasol ar ymddygiad fepio pobl ifanc, gan gynnwys derbyniad gan gyfoedion, amlygiad ar gyfryngau cymdeithasol, a negeseuon marchnata, gyda rhai astudiaethau'n awgrymu y gallai fepio gael ei ddefnyddio fel dull o ymdopi â straen a gorbryder [44,45].

Yn y cyd-destun hwn, mae rhai awduron wedi cynnig y gallai polisïau di-fêp helpu i leihau amlygrwydd a derbynioldeb cymdeithasol fepio ymhlith plant a phobl ifanc. Mae rhai astudiaethau ynglŷn â deddfau di-fwg gwladol neu genedlaethol mewn gweithleoedd, bwyta, bariau a mannau cyhoeddus dan do wedi adrodd am ostyngiadau mewn cyffredinrwydd, cychwyniad ac amllder fepio, gyda rhai tueddiadau'n dangos gostyngiad mewn defnydd o e-sigaréts ymhlith pobl ifanc dros amser [46,47,48,49,50]. Mae astudiaethau sy'n canolbwyntio ar bolisïau fepio cynhwysfawr mewn ysgolion uwchradd wedi adrodd am effeithiau tebyg ar ddefnyddio e-sigaréts hefyd, yn enwedig lle'r oedd polisïau'n cael eu gorfodi'n fwy gweithredol ac yn weladwy i fyfyrwyr [51,52]. Yn yr un modd, mewn mannau cyhoeddus hamdden a chymunedol awyr agored lle mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn debygol o fod yn bresennol, mae polisïau di-fwg a di-fêp wedi bod yn gysylltiedig â llai o ysmegu a fepio amlwg [53,54]. Mae arweiniad lleol mewn rhai rhannau o Gymru eisoes yn argymhell bod polisïau ysgol yn gwahardd fepio gan ddisgyblion, staff, ac ymwelwyr ar safle'r ysgol ac wrth deithio i'r ysgol ac oddi yno mewn cymunedau amgylchynol [55].

Disgwyliadau cymdeithasol ehangach a defnydd o nicotin: Mae mwy na hanner yr oedolion sy'n fepio yn debygol o ddefnyddio fêps a sigaréts: er bod hyn yn gallu cefnogi ymdrechion lleihau niwed trwy dorri'n ôl ar ysmegu yn y tymor byr, fe allai defnydd deuol dros gyfnod hwy gynyddu amllder defnyddio nicotin yn anfwriadol a chynnal dibyniaeth ar nicotin [56]. Yn yr un modd, mae unigolion sydd ag anhwylderau defnyddio sylweddau yn fwy tebygol o ddefnyddio nicotin ac, fel y cyfryw, fe allai amlygiad i fepio mewn lleoliadau lle y cymerir sylweddau (fel alcohol) atgyfnerthu defnydd trwy ysgogiadau cymdeithasol ac amgylcheddol cyffredin [57]. Mae tystiolaeth o brifysgolion ac ysgolion yn awgrymu cefnogaeth gref i amgylcheddau di-fwg, di-dybaco a di-fêp, yn enwedig ymhlith pobl nad ydynt yn eu defnyddio, ar ôl iddynt gael eu gweithredu [17,58,59]. Fel y cyfryw, fe allai polisïau helpu i ddatblygu agweddau llai ffafrïol tuag at ysmegu a fepio dros amser [16,60,61]. Fe allent hefyd leihau amlygiad canfyddedig i fepio a'r tebygolrwydd o fepio, er bod y rhan fwyaf o'r dystiolaeth, unwaith eto, yn ymwneud â phlant a phobl ifanc ar hyn o bryd yn hytrach na phoblogaethau oedolion mwy cyffredinol o ysmygwyr, fepwyr a phobl nad ydynt yn ysmegu nac yn fepio [15,24,62].

Amlygiad ail-law i aerosolau: Mae'r dystiolaeth ynglŷn â chanlyniadau iechyd polisïau di-fêp yn gyfyngedig o hyd. Er bod niweidiau posibl fepio ei hun yn destun dadl, mae hylifau fepio'n aml yn cynnwys nicotin yn ogystal â chyfansoddion niweidiol fel gwenwynau a charsinogenau, a allai fod ar yr un lefel sy'n cael ei hamsugno o sigaréts, neu weithiau'n uwch [63]. Yn ogystal, mae mewnanadlu

llygryddion aerosol yn ail-law yn gysylltiedig â llid synhwyrdd a chanlyniadau anadlol andwyol, fel symptomau bronchitis, gwichian yn y frest, diffyg anadl, ac asthma ^[64]. Mae'r rhan fwyaf o'r ychydig astudiaethau sy'n adrodd ar ganlyniadau amlygiad yn nodi bod amlygiad ail-law i aerosolau'n parhau ar ôl gweithredu polisi, er ei bod yn ymddangos bod amlygiad yn is lle mae cyfyngiadau cynhwysfawr ar waith ^[65,66]. Er bod amlygiad ar ei uchaf fel arfer ymhlith pobl sy'n ysmegu ac yn fepio ^[58], hunanadroddir ar fesurau yn bennaf a phrin yw'r dystiolaeth werthuso hirdymor. Ni adroddwyd am unrhyw fesurau o effeithiau posibl amlygiad ar iechyd yng nghyd-destun gweithredu polisi.

Buddion amgylcheddol: Adroddodd dwy astudiaeth ynglŷn â pholisïau di-dybaco ar gampysau colegau (a oedd hefyd yn ddi-fêp) am ostyngiadau sylweddol mewn sbwriel sy'n gysylltiedig ag ysmegu, gan gynnwys bonion sigarêts, ar ôl gweithredu'r polisi ^[67,68]. Fel arall, nid oes dystiolaeth ynglŷn â sbwriel sy'n gysylltiedig â fepio, a phrin yw'r astudiaethau sydd wedi archwilio buddion amgylcheddol posibl gweithredu polisi. Er bod gwerthusiadau o'r Gwaharddiad ar Fêps Tafladwy yn y Deyrnas Unedig – a gyflwynwyd yn rhannol i leihau gwastraff electronig – ar gam cynnar hefyd, mae adroddiadau cychwynnol wedi amlygu buddion posibl mewn perthynas â lleihau nifer y fêps sy'n cael eu gadael fel sbwriel ^[69]. Ar yr un pryd, mynegwyd pryderon ynglŷn â heriau gorfodi ac effeithiau posibl disodli'r farchnad, gan gynnwys symudiadau tuag at gynhyrchion amgen a sianeli cyflenwi anffurfiol ^[70]. At ei gilydd, mae'r dystiolaeth sydd ar gael yn awgrymu, er gwaethaf cyfyngiadau polisi diweddar, bod gwastraff sy'n gysylltiedig â fepio yn parhau i fod yn uchel, gyda thua chwe miliwn o fêps a phodiau'n cael eu gwaredu bob wythnos ^[71].

Ystyriaethau cyflawni a gweithredu

Mae'r dystiolaeth yn awgrymu y gellir gweithredu polisïau di-fêp trwy ystod o ddulliau cydategol, gan gynnwys ymgyrchoedd cyfathrebu ac addysg, polisïau sefydliadol, is-ddeddfau awdurdodau lleol, a deddfwriaeth genedlaethol. Amlinellir y dulliau hyn isod, gan gyfeirio at gasgliadau astudiaethau.

Derbynioldeb polisi ac ymgysylltu â rhanddeiliaid: Mae'r dystiolaeth yn awgrymu'n gyson fod cefnogaeth i bolisïau di-fêp yn aml yn uchel ymhlith pobl nad ydynt yn fepio, ond yn tueddu i fod yn is ymhlith pobl sy'n ysmegu neu'n fepio, sy'n achosi risg bosibl i gydymffurfio â'r polisi ^[17,66,72]. Yn aml hefyd, nid oedd unigolion yn ymwybodol o bolisïau fepio neu'n camddeall beth oedd dan sylw ^[17,58,66], sy'n amlygu materion posibl yn ymwneud ag ymwybyddiaeth o bolisi. Felly, fe allai fod yn bwysig ymgysylltu'n gynnar â staff, myfyrwyr, aelodau'r gymuned, busnesau a defnyddwyr gwasanaethau i gynyddu dealltwriaeth o amcanion polisi, nodi rhwystrau rhag gweithredu, a chefnogi derbynioldeb ehangach o'r polisi.

Rhoi'r gorau i ysmegu, cymorth ac addysg: Mae sawl astudiaeth yn amlygu pwysigrwydd sicrhau bod polisïau di-fêp yn cael eu cyflwyno ynghyd â chymorth i roi'r gorau, ymyriadau ymddygiadol, ac addysg. Yn aml, mae casgliadau astudiaethau'n nodi bod cyfyngiadau ar eu pen eu hunain yn annhebygol o hyrwyddo cyfraddau defnydd is, ac y gallai polisïau fod yn llai effeithiol heb gymorth sydd ar gael yn rhwydd, ymyriadau ysgogiadol ac addysg gyhoeddus ^[24,25,62,73]. Fe allai canfyddiadau ynglŷn â'r niweidiau sy'n gysylltiedig â fepio amrywio ar draws poblogaethau hefyd, gan fod y dystiolaeth yn awgrymu y gall risgiau iechyd gael eu bychanu, eu camddeall, neu fod yn destun cryn ansicrwydd ^[74,75]. Fe allai'r ystyriaeth hon fod yn arbennig o bwysig pan fydd polisïau'n effeithio ar boblogaethau lle mae ysmegu'n gyffredin neu unigolion sy'n defnyddio e-sigarêts i'w helpu i roi'r gorau i ysmegu.

Cydymffurfio, gorfodi a chanlyniadau anfwriadol: Mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod strategaethau gorfodi presennol, yn enwedig ar gyfer polisïau sefydliadol, yn wan. Mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o bolisïau'n dibynnu ar orfodi a arweinir gan y gymuned a chyfoedion yn hytrach na dulliau gorfodi ffurfiol. Er enghraifft, yn aml, roedd rhybuddion, cosbau a gweithdrefnau disgyblu'n cael eu



cymhwyso'n anghyson neu i'w gweld yn anaml ar draws y poblogaethau a astudiwyd [25,66,76,77]. Amlygodd sawl astudiaeth fod hyn yn rhwystro rhag gweithredu, gan nodi bod diffyg hyder yn aml ymhlith myfyrwyr, staff ac aelodau'r gymuned i herio unigolion a oedd yn ysmegu neu'n fepio mewn ardaloedd cyfyngedig neu eu bod yn teimlo nad oeddent yn gallu eu herio [78,79]. Mae astudiaethau hefyd yn amlygu pwysigrwydd sicrhau bod gan staff a gweithredwyr polisi ddigon o wybodaeth am gynhyrchion fepio a gofynion polisi, oherwydd gallai anawsterau wrth adnabod dyfeisiau a hyfforddiant cyfyngedig rwystro gweithredu a gorfodi'n effeithiol [62,80,81]. Felly, dylai ystod o ddulliau gorfodi ffurfio rhan o'r pecyn gweithredu ehangach ac fe allent gryfhau cydymffurfio o'u cyfuno â mesurau gweithredu eraill.

Monitro, gwerthuso ac addasu: Wrth i bolisiau barhau i ddatblygu, bydd monitro a gwerthuso'n elfennau pwysig o weithredu yn y dyfodol o ystyried bod y sylfaen dystiolaeth ar gam cymharol gynnar. Yn aml, mae astudiaethau'n amlygu ansicrwydd ynglŷn â chydymffurfio, canlyniadau anfwriadol fel disodli neu fepio llechwraidd, ac effeithiau tymor hwy ar ymddygiad ysmegu a fepio [23,26,27]. Fe allai monitro rheolaidd helpu i amlygu heriau gweithredu a llywio'r broses o fireinio polisi yn y dyfodol. Mae hefyd yn bwysig cydnabod bod ymddygiad defnyddio nicotin yn debygol o barhau i esblygu ochr yn ochr â dyfeisiau [80,81,82]. Lle y cyfyngir ar gynhyrchion sy'n cynhyrchu mwg neu anwedd, fe allai unigolion droi fwyfwy at gynhyrchion nicotin amgen y gellir eu defnyddio'n gynnil ac efallai na fyddant yn destun yr un cyfyngiadau ymarferol ag ysmegu neu fepio. Fel y cyfryw, dylai gweithredu barhau i ystyried sut gallai cynhyrchion sy'n dod i'r amlwg gyd-fynd â chwmpas dulliau polisi a rheoleiddiol sy'n ehangu.

Dylunio a gweithredu polisi: At ei gilydd, mae'r dystiolaeth yn awgrymu y dylai polisiau di-fwg gael eu hystredu i gynnwys gofynion di-fêp hefyd, yn enwedig mewn lleoliadau addysgol [25,58,66]. Mae polisiau safle cyfan neu fan cyfan yn fwy eglur, yn cefnogi gweithredu, ac yn gysylltiedig ag amlygiad is, llai o ysmegu a fepio amlwg, a chanlyniadau polisi cryfach na dulliau sy'n dibynnu ar ardaloedd ysmegu dynodedig neu gyfyngiadau cyfyngedig [15,50,65]. Mae rhai pryderon ynglŷn â fepio llechwraidd a disodli ymddygiad ysmegu a fepio yn parhau ar draws dulliau polisi, sy'n amlygu ystyriaethau pwysig ynglŷn â chanlyniadau anfwriadol gweithredu [26,27]. Gan adlewyrchu'r dystiolaeth ynglŷn â pholisiau di-fwg, ategir gweithredu llwyddiannus fel arfer gan y canlynol:

- Cyfathrebu clir a chyson
- Arwyddion amlwg a ffiniau di-fwg a di-fêp sydd wedi'u diffinio'n glir
- Cynyddu ymwybyddiaeth ac ymgysylltu'n barhaus (e.e., ymyriadau atal ac addysgol)
- Mynediad at gymorth i roi'r gorau i ysmegu
- Monitro cydymffurfedd a dulliau adborth (e.e., cefnogi seilweithiau data effeithiol a thempledi adrodd)
- Trefniadau gorfodi priodol
- Hyfforddi staff a chynyddu capasiti, yn enwedig mewn lleoliadau addysgol
- Arweinyddiaeth, ymrwymiad sefydliadol, a hyrwyddwyr polisi
- Defnyddio dulliau adborth i gefnogi adolygu ac addasu polisiau'n rheolaidd wrth i gynhyrchion ac ymddygiad esblygu

Beth mae hyn yn ei olygu i Gymru?

At ei gilydd, dylid cydnabod bod y dystiolaeth ynglŷn â mannau di-fêp yn aml wedi'i chynnwys o fewn polisiau presennol neu estynedig ar gyfer mannau di-fwg. Fel y cyfryw, mae'r **dystiolaeth gryfaf ynglŷn â pholisiau di-fêp effeithiol** yn ymwneud â: lleihau amlygrwydd a derbynioldeb cymdeithasol fepio, ffurfio disgwyliadau cymdeithasol ynglŷn â defnyddio nicotin, amddiffyn rhag amlygiad anwirfoddol posibl i fepio ac aerosolau ail-law, a chefnogi amcanion atal ieuencid sy'n ceisio lleihau apêl fepio a defnydd o fêps.



Mae'r argymhellion a amlinellir ym mriff polisi Iechyd Cyhoeddus Cymru (2026), *Ymestyn Mannau Awyr Agored Di-fwg yng Nghymru: Cyfleoedd trwy'r Ddeddf Tybaco a Fêps*, yn parhau i fod yn berthnasol i ymestyn manau di-fwg i fannau di-fêp. O'i hystyried yn ei chyfanrwydd, mae'r dystiolaeth yn awgrymu'r ystyriaethau canlynol ar gyfer datblygu polisi yn y dyfodol:

1. Blaenoriaethu lleoliadau lle ceir y sail resymegol gryfaf dros fannau di-fêp, yn enwedig lleoliadau addysgol a manau hamdden a chymunedol a ddefnyddir gan blant, pobl ifanc a theuluoedd. Fe allai hyn gynnwys ysgolion, colegau a champysau prifysgolion, yn ogystal â lleoliadau a meysydd chwaraeon, parciau, canol trefi, ardaloedd aros am drafnidiaeth, digwyddiadau awyr agored, lleoliadau lletygarwch, traethau, a manau hamdden eraill (e.e. ffeiriau pleser, swau a ffermydd anwesu).
2. Defnyddio lleoliadau sefydliadol i lywio gweithredu manau di-fêp yn ehangach wrth ymestyn polisiâu di-fwg, gan fod dystiolaeth yn awgrymu bod polisiâu di-fêp yn gallu lleihau amlygiad i fepio a chefnogi disgwyliaid cymdeithasol iachach ymhlith oedolion ifanc mewn lleoliadau addysgol, ar yr un pryd â darparu gwybodaeth werthfawr am gyflawni a chydymffurfio â pholisi.
3. Canolbwyntio ar leihau cyfleoedd ar gyfer fepio'n amlwg, "fepio llechwraidd" ac amlygiad anwirfoddol posibl i aerosolau ail-law, yn enwedig mewn lleoliadau lle mae pobl yn agos i'w gilydd (e.e., lleoliadau dan do) neu lle mae plant a phobl ifanc yn debygol o fod yn bresennol.
4. Ffaffrio dulliau di-fwg cynhwysfawr a ymestynnir i fannau di-fêp yn hytrach na chyfyngiadau rhannol er mwyn lleihau effeithiau disodli ar gyfer fepio gymaint â phosibl, oherwydd gallai polisiâu safle cyfan neu fan cyfan fod yn gysylltiedig â chanlyniadau iechyd a pholisi cryfach a mwy cyson, yn enwedig lle yr ategir y rhain ymhellach gan ddeddfwriaeth genedlaethol ynglŷn â fepio. Fe allai dulliau rhannol (e.e., lle mae polisiâu'n berthnasol i ysmegu yn unig, neu lle y caniateir fepio mewn rhai ardaloedd/ parthau) gyfrannu at ansicrwydd ynglŷn â chwmpas polisi ac effeithiau disodli posibl ar gyfer fepio.
5. Ymgorffori cynllunio ar gyfer gweithredu manau di-fêp mor gynnar â phosibl lle bwriedir ymestyn polisiâu di-fwg, gan gynnwys cyfathrebu clir, gweithgarwch ymwybyddiaeth gyhoeddus, arwyddion amlwg, ffiniau a ddiffiniwyd yn glir, ymgysylltu â rhanddeiliaid a mynediad at gymorth i roi'r gorau i ysmegu.
6. Teilwra dulliau gweithredu ar gyfer manau di-fêp i wahanol leoliadau, gan gydnabod nad oes model cyflawni unigol sy'n briodol i bob amgylchedd dan do ac awyr agored.
7. Sicrhau bod trefniadau cydymffurfio a gorfodi wedi'u diffinio'n glir ar gyfer manau di-fêp, gan gydnabod bod cyfathrebu a disgwyliaid cymdeithasol yn bwysig, ond bod pwerau cyfreithiol a rheoleiddiol yn darparu fframwaith pwysig i gefnogi gweithredu polisi, pan fydd angen.
8. Cynnwys monitro a gwerthuso mewn datblygiadau polisi yn y dyfodol ar gyfer fepio, gan alluogi Cymru i gynhyrchu dystiolaeth penodol i leoliad ynglŷn â gweithredu, cydymffurfio, effeithiolrwydd a derbynioldeb cyhoeddus.

Cyhoeddwyd: Medi 2026

Fersiwn: 1

Awduron: Iechyd Cyhoeddus Cymru: Rochelle Embling, Uwch Swyddog Ymchwil a Gwerthuso; Felicia Frennesson, Cynorthwy-ydd Ymchwil; Laura Rich, Prif Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd; Mary-Ann McKibben, Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd.

Dyfynnu'r cyhoeddiad hwn: Ceir atgynhyrchu'r deunydd a gynhwysir yn y ddogfen hon o dan delerau'r [Drwydded Llywodraeth Agored](#) (OGL) ar yr amod y gwneir hynny'n gywir ac nad yw'n cael ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Dylid cydnabod Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Manylion cyswllt: I gael at yr Adolygiad Cyflym llawn (Saesneg yn unig) neu ar gyfer unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r briff hwn, cysylltwch â'r canlynol: PHW.TVNAP@wales.nhs.uk

Cyfeiriadau

1. Nikogosian, H. (2010) WHO Framework Convention on Tobacco Control: a key milestone. Bull. World Health Organ. 88, 83 .
2. World Health Organization. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008: The MPOWER Package. (2008).
3. World Health Organization. WHO Policy Recommendations: Protection from Exposure to Second-Hand Tobacco Smoke. (2007).
4. World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. Decision FCTC/COP10(23): Specific Guidelines to Address Cross-Border Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship and the Depiction of Tobacco in Entertainment Media for Implementation of Article 13 (Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship) of the WHO FCTC. <https://storage.googleapis.com/who-fctc-cop10-source/Decisions/fctc-cop-10-23-en.pdf> (2024).
5. World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. Decision FCTC/COP7(9): Electronic Nicotine Delivery Systems and Electronic Non-Nicotine Delivery Systems (ENDS/ENNDS). <https://fctc.who.int/resources/publications/m/item/fctc-cop7%289%29-electronic-nicotine-delivery-systems-and-electronic-nicotine-delivery-systems> (2016).
6. World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. Electronic Nicotine Delivery Systems and Electronic Non-Nicotine Delivery Systems (ENDS/ENNDS): Report to the Seventh Session of the Conference of the Parties. <https://www.who.int/publications/m/item/electronic-nicotinedelivery-systems-and-electronic-non-nicotine-delivery-systems-%28ends-ennds%29> (2016).
7. World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS): Report by WHO to the Sixth Session of the Conference of the Parties. FCTC_COP6_10Rev1-en.pdf (2014).
8. Royal College of Paediatrics and Child Health. Policy Briefing: Vaping in Young People. <https://www.rcpch.ac.uk/resources/policy-briefing-vaping-young-people> (2025).
9. Public Health Scotland. Tobacco Position Statement: Stopping Tobacco Smoking and Youth Vaping in Scotland. <https://publichealthscotland.scot/publications/tobacco-position-statement/> (2024).
10. Department of Health and Social Care. Smoke-Free, Heated Tobacco-Free and Vape-Free Places in England. <https://www.gov.uk/government/consultations/smoke-free-heated-tobacco-free-and-vape-free-places-in-england> (2026).
11. Public Health Wales. Vapes (e-Cigarettes) Position Statement. <https://phw.nhs.wales/app/uploads/sites/2/2026/06/Vapes-e-cigarettes-Position-Statement.pdf> (2026).
12. Frazer, K. et al. Legislative smoking bans for reducing harms from secondhand smoke exposure, smoking prevalence and tobacco consumption. Cochrane Database of Systematic Reviews 10.1002/14651858.CD005992.pub3 (2016).
13. Faber, T. et al. Effect of tobacco control policies on perinatal and child health: a systematic review and meta-analysis. Lancet Public Health 2, e420 (2017).
14. Akter, S. et al. Evaluation of Population-Level Tobacco Control Interventions and Health Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Netw. Open 6, E2322341 (2023).
15. Ickes, M. J., Wiggins, A. T., Rayens, M. K. & Hahn, E. J. Student Tobacco Use Behaviors on College Campuses by Strength of Tobacco Campus Policies. American Journal of Health Promotion 34, 747-753 (2020).
16. Rogers, C. J., Barrington-Trimis, J. L., Unger, J. B. & Forster, M. Changes in smoking prevalence and perception of smoking on campus before and after a smoke-free university campus policy. Journal of American College Health 70, 973-977 (2022).

17. Brown, E. M., Henes, A. L. & Olson, L. T. E-Cigarette Policies on College Campuses: Student Use Behaviors, Awareness, and Policy Support. *Journal of Community Health* 2016 41:6 41, 1110–1115 (2016).
18. Allen, B. & Stuart, G. L. Decreased Cigarette Smoking but No Change in Use of Electronic Cigarettes Following a University-Wide Smoking Ban. *Subst. Abuse* 13, (2019).
19. Leavens, E. L. S. et al. Electronic cigarette and combustible cigarette use following a campus-wide ban: Prevalence of use and harm perceptions. *Journal of American College Health* 68, 332–335 (2020).
20. Cheng, K. W. et al. Impact of vaping restrictions in public places on smoking and vaping in the United States—evidence using a difference-in-differences approach. *Addiction* 118, 160–166 (2023).
21. Yang, M., Russell, A. & Lin, H. C. Association between Inclusion of E-Cigarettes in Statewide Comprehensive Smoke-Free Indoor Air Laws and Vaping Behaviors: Results from a Longitudinal Population Study. *Subst. Use Misuse* 57, 806–814 (2022).
22. Nguyen, H. V. & Bornstein, S. Changes in adults' vaping and smoking behaviours associated with aerosol-free laws. *Tob. Control* 30, 644–652 (2021).
23. Russell, A. M., Yang, M., Barry, A. E., Merianos, A. L. & Lin, H. C. Stealth Vaping Among College Students on Four Geographically Distinct Tobacco-Free College Campuses: Prevalence and Practices. *Nicotine & Tobacco Research* 24, 342–348 (2022).
24. Yang, M., Russell, A. M., Barry, A. E., Merianos, A. L. & Lin, H. C. Stealth vaping and associated attitudes, perceptions, and control beliefs among US college students across four tobacco-free campuses. *Addictive Behaviors* 136, 107490 (2023).
25. Sendall, M. C., Le Lievre, C., McCosker, L. K. & Brewis, L. Going smoke-free: University staff and students' qualitative views about smoking on campus during the implementation of a smoke-free policy. *PLoS One* 15, e0236989 (2020).
26. Rozema, A. D., Hiemstra, M., Mathijssen, J. J. P., Jansen, M. W. J. & van Oers, H. J. A. M. Impact of an Outdoor Smoking Ban at Secondary Schools on Cigarettes, E-Cigarettes and Water Pipe Use among Adolescents: An 18-Month Follow-Up. *International Journal of Environmental Research & Public Health* [Electronic Resource] 15, (2018).
27. Dunbar, M. S. et al. Exposure to vaping and smoking prohibitions and nicotine and cannabis vaping in a California-based sample of young adults: An ecological momentary assessment study. *Addictive Behaviors* 167, 108357 (2025).
28. Cooper, M. T. & Pesko, M. F. The effect of e-cigarette indoor vaping restrictions on adult prenatal smoking and birth outcomes. *J. Health Econ.* 56, 178–190 (2017).
29. Garcia, P. M. Impact of Campus Tobacco-Free Policy on Tobacco and Electronic Nicotine Delivery Systems Initiation and Cessation among Students, Faculty, and Staff Article Details. *J Pub Health Issue Pract* 4, 159 (2020).
30. Marion, J. W., Strand, A. & Baldrige, E. Changes in student behaviors and policy opinion regarding E-cigarettes at a Kentucky University from 2014 to 2018. *Prev. Med. Rep.* 22, 101364 (2021).
31. Jerzyński, T. & Stimson, G. V. Estimation of the global number of vapers: 82 million worldwide in 2021. *Drugs, Habits and Social Policy* 24, 91–103 (2023).
32. ASH Wales. ASH Wales Annual Adult Population Survey 2025. <https://ash.wales/wpcontent/uploads/2025/09/ASH-Wales-Annual-Adult-Population-Survey-2025-1.pdf> (2025).
33. Taylor, E. et al. Exposure to Tobacco-Specific Nitrosamines Among People Who Vape, Smoke, or do Neither: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nicotine & Tobacco Research* 26, 257–269 (2024).
34. Kundu, A. et al. Cardiovascular health effects of vaping e-cigarettes: a systematic review and metaanalysis. *Heart* 111, 599–608 (2025).

35. Kundu, A. et al. Evidence update on the respiratory health effects of vaping e-cigarettes: A systematic review and meta-analysis. *Tob. Induc. Dis.* 23, 1–16 (2025).
36. Dunn, D. S. et al. Displacement imposition scale assesses reactions of cigarette and e-cigarette users impacted by a campus-wide smoking ban. *Journal of American College Health* 71, 1479–1485 (2023).
37. Voigt, K. Smoking norms and the regulation of E-cigarettes. *Am. J. Public Health* 105, 1967–1972 (2015).
38. Kadel, R. et al. The Cost of Smoking in Wales. <https://phwwhocc.co.uk/resources/the-cost-of-smoking-in-wales/> (2026).
39. Lindson, N. et al. Electronic cigarettes for smoking cessation. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 10.1002/14651858.CD010216.pub10 (2025).
40. Children's Commissioner for Wales. Vaping. <https://www.childcomwales.org.uk/our-work/policy-positions/vaping/> (2026).
41. Public Health Wales. Vaping amongst Children and Young People in Wales Incident Response Group: Incident Report. <https://phw.nhs.wales/news/tackle-dependency-visibility-and-availability-to-address-rapid-rise-in-youth-vaping-say-public-health-experts/vaping-amongst-children-and-young-people-in-wales-incident-response-group-report/> (2024).
42. Begh, R. et al. Electronic cigarettes and subsequent cigarette smoking in young people: A systematic review. *Addiction* 120, 1090–1111 (2025).
43. Onojighofia Tobore, T. On the potential harmful effects of E-Cigarettes (EC) on the developing brain: The relationship between vaping-induced oxidative stress and adolescent/young adults social maladjustment. *J. Adolesc.* 76, 202–209 (2019).
44. Smith, H., Lucherini, M., Amos, A. & Hill, S. The emerging norms of e-cigarette use among adolescents: A meta-ethnography of qualitative evidence. *International Journal of Drug Policy* 94, 103227 (2021).
45. Biles, J. et al. Perspectives, motivations, and experiences of adolescents and young adults using nicotine vapes: a qualitative review. *Health Promot. Int.* 40, (2025).
46. Choi, K., Omole, T., Wills, T. & Merianos, A. L. E-cigarette-inclusive smoke-free policies, excise taxes, tobacco 21, and changes in youth e-cigarette use: 2017-2019. *Tob. Control* 31, 758–761 (2022).
47. Kcomt, L. et al. Comprehensive E-Cigarette Policies Are Associated With Lower Use Among U.S. Adolescents and Young Adults. *J. Stud. Alcohol Drugs* <https://doi.org/10.15288/jsad.25-00377> (2026).
48. Kelly, B. C., Vuolo, M., Orsini, M. M., Maggs, J. L. & Staff, J. Tobacco Policy and ENDS Policy Influences on Adolescent Vaping Across the U.S. States. *Am. J. Prev. Med.* 65, 1026–1033 (2023).
49. Vuolo, M., Orsini, M. M., Staff, J., Maggs, J. L. & Kelly, B. C. Comprehensive vaping bans are associated with lower odds of initiation into electronic nicotine delivery systems use among young people. *Addiction* 119, 1037–1047 (2024).
50. Ollila, H., Tarasenko, Y., Ciobanu, A., Lebedeva, E. & Raitasalo, K. Exclusive and dual use of electronic cigarettes among European youth in 32 countries with different regulatory landscapes. *Tob. Control* 33, 622–627 (2024).
51. Milicic, S., DeCicca, P., Pierard, E. & Leatherdale, S. T. An evaluation of school-based e-cigarette control policies' impact on the use of vaping products. *Tob. Induc. Dis.* 16, 35 (2018).
52. Nicksic, N. E., Harrell, M. B., Pérez, A., Pasch, K. E. & Perry, C. L. School Policy, Administrator Perceptions, and Student E-cigarette Use. *Health Behav. Policy Rev.* 5, 72–82 (2018).
53. Brinson, D., Ward, C., Ford, C. & Begg, A. Smokefree and vape-free streets: high levels of support from tourists, residents and businesses, implications for tourist-destination communities in New Zealand. *NZ Med J* 135, 73–84 (2022).
54. Porcellato, L., Gee, I. & Harris, J. Evaluation of the July 2022 Liverpool Smokefree Sidelines No

- Smoking Policy at Youth Football. (2022).
55. Aneurin Bevan University Health Board. Public Health Guidance on Vaping/E-cigarettes for Schools and Colleges in Gwent. <http://bit.ly/HMQ-Gwent> (2023).
 56. Coleman, S. R. M., Piper, M. E., Byron, M. J. & Bold, K. W. Dual Use of Combustible Cigarettes and E-cigarettes: a Narrative Review of Current Evidence. <https://doi.org/10.1007/s40429-022-00448-1> doi:10.1007/s40429-022-00448-1.
 57. Hershberger, A. R., Karyadi, K. A. & Cyders, M. A. Prohibition of e-cigarettes in the US: Are prohibitions where alcohol is consumed related to lower alcohol consumption? *J. Public Health Policy* 37, 483 (2016).
 58. Abraham, O. et al. Stakeholder perspectives of tobacco use on campus and implementation of a tobacco-free policy at a Midwest university. *Tob. Prev. Cessat.* 11, 10–18332 (2025).
 59. Sendall, M. C., Fox, L. & Wraith, D. University Staff and Students' Attitudes towards a Completely Smoke-Free Campus: Shifting Social Norms and Organisational Culture for Health Promotion. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2021, Vol. 18, Page 7104 18, 7104 (2021).
 60. Nicksic, N. E., Harrell, M. B., Pérez, A., Pasch, K. E. & Perry, C. L. School Policy, Administrator Perceptions, and Student E-cigarette Use. *Health Behav. Policy Rev.* 5, 72 (2018).
 61. Agaku, I. T., Perks, S. N., Odani, S. & Glover-Kudon, R. Associations between public e-cigarette use and tobacco-related social norms among youth. *Tob. Control* 29, 332–340 (2020).
 62. Patel, M., Donovan, E. M., Simard, B. J. & Schillo, B. A. E-cigarette school policy and staff training: Knowledge and school policy experiences with e-cigarette products among a national sample of US middle and high school staff. *PLoS One* 17, e0264378 (2022).
 63. Feeney, S., Rossetti, V. & Terrien, J. E-Cigarettes—a review of the evidence—harm versus harm reduction. *Tob. Use Insights* 15, (2022).
 64. Sailis, A. B. et al. Effects of secondhand exposure to e-cigarette aerosol on lung health: a systematic review. *Journal of Public Health* 2026 1–10 (2026) doi:10.1007/S10389-026-02740-0.
 65. Azagba, S., Shan, L. & Manzione, L. Associations of home and workplace vaping restrictions with e-cigarette use among U.S. adults. *Prev. Med. (Baltim.)* 139, (2020).
 66. Al-Jayyousi, G. F. et al. Students' perceptions of a university 'No Smoking' policy and barriers to implementation: a cross-sectional study. *BMJ Open* 11, e043691 (2021).
 67. Clemons, K., Johnson, D. B., Kiger, A. & Putnam, J. DECREASING CAMPUS SMOKING WITH PUNISHMENTS AND SOCIAL PRESSURES. *Contemp. Econ. Policy* 36, 629–643 (2018).
 68. Fujita, S. & Marteache, N. Evaluation of a smoke- and tobacco-free campus policy: The issue of displacement. *Journal of American College Health* 70, 598–606 (2022).
 69. Keep Scotland Beautiful. A year on from the single-use vape ban – what's changed? <https://www.keepsotlandbeautiful.org/news/2026/june/a-year-on-from-the-single-use-vape-ban-what-s-changed/> (2026).
 70. ASH Wales. One year after disposable vape ban, reports rise tenfold. <https://ash.wales/one-year-after-disposable-vape-ban/> (2026).
 71. Material Focus. 6m vapes and pods are thrown away every week despite the vape ban. <https://materialfocus.org.uk/?press-releases=6m-vapes-and-pods-are-thrown-away-every-week-despite-the-vape-ban> (2026).
 72. Braverman, M. T., Hoogesteger, L. A., Johnson, J. A. & Aaro, L. E. Supportive of a smoke-free campus but opposed to a 100% tobacco-free campus: Identification of predictors among university students, faculty, and staff. *Prev. Med. (Baltim.)* 94, 20–26 (2017).
 73. Dunn, D. S. et al. Displacement imposition scale assesses reactions of cigarette and e-cigarette users impacted by a campus-wide smoking ban. *Journal of American College Health* 71, 1479–1485 (2023).
 74. Agaku, I. T., Perks, S. N., Odani, S. & Glover-Kudon, R. Associations between public e-cigarette use

- and tobacco-related social norms among youth. *Tob. Control* 29, 332–340 (2020).
75. Meernik, C. et al. Electronic cigarettes on hospital campuses. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 13, 87 (2016).
 76. Ramachandran, S., Bentley, S., Casey, E. & Bentley, J. P. Prevalence of and factors associated with violations of a campus smoke-free policy: a cross-sectional survey of undergraduate students on a university campus in the USA. *BMJ Open* 10, e030504 (2020).
 77. Yang, J. S., Faruqi, A., Sou, A. & Mackey, T. K. Non-compliance with university tobacco-free policies: A qualitative exploration. *Tob. Prev. Cessat.* 8, 14 (2022).
 78. Powell, S. et al. Knowledge and Behaviors Associated with a Campus Tobacco-Free Policy. *Am. J. Undergrad. Res.* 14, 39 (2018).
 79. Gatto, A. et al. A Mixed-Methods Assessment of a Peer-Enforced Tobacco- and Smoke-Free Policy at a Large Urban University. *Journal of Community Health* 2018 44:2 44, 365–376 (2018).
 80. Cole, A. G., Lienemann, B. A., Sun, J., Chang, J. & Zhu, S.-H. California school staff reports of seeing students vaping at school and disciplinary actions. *The Journal of School Nursing* 40, 618–629 (2024).
 81. Ma, H. & Perez, R. School personnel's experiences with implementing Texas House Bill 114 on vaping: A qualitative study. *Health Educ. J.* 84, 530–541 (2025).
 82. Yingst, J. M. et al. E-cigarette users commonly stealth vape in places where e-cigarette use is prohibited. *Tob. Control* 28, 493–497 (2019)