



Ai'r frech goch ydyw?


Negeseuon allweddol ar gyfer gofal sylfaenol

Mae cyfraddau brechiad MMR wedi gostwng yng Nghymru. Brech a thymheredd? Gallai fod yn frech goch. Ynyswch unrhyw un sydd â brech a thymheredd mewn ystafell ochr pan fyddant yn cyrraedd.

Y Frech Goch

Symptomau cychwynnol

Annwyd, peswch, llid yr amrannau, twymyn (2-4 diwrnod cyn i frech ymddangos). Mae'r dwymyn yn cyrraedd uchafbwynt o gwmpas dechrau'r frech.



Brech

Coch, blotiog, macwlopapwlaidd (ddim yn cosi) sy'n para 3-7 diwrnod. Mae fel arfer yn dechrau y tu ôl i'r clustiau, gan ledaenu i'r wyneb ac yna'r bongorff, a gall fod yn gyffredinol (yn fwy anodd ei gweld ar groen tywyll).



Smotiau Koplik

Briwiau bach gwyn neu las/gwyn ar fwcosa'r foch (gall ymddangos ar ddechrau'r frech a phara 2-3 diwrnod). Maent yn arwydd annibynadwy o'r frech goch oherwydd gellir eu drysu â briwiau eraill y geg.



Cyfnod heintus

8 diwrnod (4 diwrnod cyn i'r frech ymddangos tan 4 diwrnod llawn ar ôl hynny).

Salwch brech eraill tebyg

Brech rosynnaidd, haint parfofeirws, y dwymyn goch – gall nodi'r frech goch yn seiliedig ar nodweddion clinigol yn unig fod yn annibynadwy.

Os ydych yn amau'r frech goch

Ynyswch unrhyw un sy'n cyflwyno gyda brech a thwymyn ar unwaith

Adolygiad personol

Ar amheuaeth glinigol o'r frech goch, rhybuddiwrh staff y dderbynfa. Cyfeiriwrh y claf i ystafell ochr pan fydd yn cyrraedd a'i gadw i ffwrdd oddi wrth gleifion eraill.

Adrodd

Dylai clinigwyr adrodd am achosion a amheuir o'r frech goch i Iechyd Cyhoeddus Cymru ar frys dros y ffôn er mwyn hwyluso asesiad risg prydion a chamau gweithredu iechyd cyhoeddus. Gall gweithwyr iechyd proffesiynol ffonio 0300 00 300 32 a/neu fynd i AWARe/Y Tîm Diogelu Iechyd - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

Gwiriwrh am ffactorau risg y frech goch:

- Unigolyn heb ei frechu neu wedi'i frechu'n rhannol?
- Amlygiad diweddar i frech/salwch?
- Teithio yn ddiweddar i wledydd/ardaloedd lle mae endemig o'r frech goch?
- Galwedigaeth (e.e., gweithiwr gofal iechyd, gweithiwr meithrin)?

Lleoliadau cymunedol

- Eithriwrh o'r meithrin/lleoliadau addysgol/gwaith am 4 diwrnod cyn a 4 diwrnod ar ôl dechrau'r frech.
- Dylent ddychwelyd dim ond ar ôl gwella'n llawn oherwydd risg uchel o haint.

Brechiad

Ar gyfer cleifion

- Gwiriwrh hanes brechiad y claf.
- Cynigiwrh y brechlyn MMR i'r rhai nad ydynt wedi'u hamddiffyn yn llawn (ar ôl gwella'n glinigol).
- Mae angen 2 ddos ar blant: y cyntaf pan fyddant yn 12 mis, yr ail pan fyddant yn 3 oed a 4 mis.
- Nid oes terfyn oedran uwch ar gyfer brechiad MMR.
- Nid yw brechiad MMR cyn 1 oed yn cael ei gydnabod yn y DU.
- Mae pobl a anwyd cyn 1970 yn debygol o fod wedi cael haint naturiol. Cynigiwrh y brechlyn MMR ar gais neu os ydynt yn wynebu risg uchel o amlygiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y **Green Book Chapter 21: Measles** (safle allanol).

Ar gyfer staff

- Dylai cyflogwyr sichau bod gan yr holl staff imiwnedd naturiol neu eu bod wedi cael 2 ddos llawn o'r brechlyn MMR.
- Gall amlygiad i'r frech goch gan staff heb eu hamddiffyn ei gwneud yn ofynnol eu heithrio o'r gwaith am 21 diwrnod.

Gwybodaeth am MMR i weithwyr iechyd proffesiynol: [icc.gig.cymru/mmr](#)

Gwybodaeth am MMR i'r cyhoedd: [icc.gig.cymru/brechlynMMR](#)

Gwybodaeth am MMR mewn fformatau hygrych: [icc.gig.cymru/brechlynau/adnoddau-hygrych](#)



DS: mae rhai o'r dolenni sydd wedi'u cynnwys yn yr wybodaeth hon yn arwain at gynnwys sydd wedi'i greu gan sefydliadau eraill ac effalai na fydd ar gael yn y Gymraeg.

Fersiwn 1, Ebrill 2024
© 2024 Ymddriedolaeth GIG
Iechyd Cyhoeddus Cymru (gyda chydnewyddiaeth i UKHSA)
ISBN: 978-1-83766-379-8



Version 1, April 2024
© 2024 Public Health Wall Trust (with acknowledgement to UKHSA)
ISBN: 978-1-83766-378-1

Vaccination

For patients

- Check the patient's vaccination history.
 - Offer the MMR vaccine to those not fully protected (once clinically recovered).
 - Children need 2 doses: the first at 12 months, the second at 3 years and 4 months.
 - There is no upper age limit for MMR vaccination.
 - MMR vaccination before age 1 is not recognised in the UK.
 - People born before 1970 are likely to have had natural infection. Offer the MMR vaccine or if they are at high risk of exposure. Further information is available in the **Green Book Chapter 21: Measles**.

Key messages for primary care Is it measles?

GIG CYMRU NHS Wales Public Health
Lechyd Cyhoeddus Cymru



Mae Brechu yn achub bywydau
Vaccination saves lives



Key messages Is it measles?

Medals

Initial symptoms

days before a rash appears). Fever peaks around the onset of the rash.

In-person review

Isolate anyone presenting with a rash and fever immediately

If you suspect measles


Other similar rash illnesses

- Rosacea, parvovirus infection, scarlet fever - identification of measles based on clinical features alone may be unreliable.

Community settings

- Unvaccinated or partially vaccinated individual?
 - Recent exposure to rash/illness?
 - Recent travel to measles-endemic countries/areas?
 - Occupation (e.g., healthcare worker, nursery worker)?
 - Exclude from nursery/educational settings after rash onset.
 - Settling/work for 4 days before and 4 days after rash onset.
 - Return only after full recovery due to high infection risk

Koplik spots



Red, blotchy, maculopapular (not itchy) lasting 3-7 days. Usually starts behind the ears, spreading to the face then the trunk, and can become generalised (more difficult to spot on dark skin).

Rash

A close-up photograph of a human eye, likely a child's, showing significant conjunctival injection (redness) and irritation. The conjunctiva is a thin membrane covering the front of the eye and the inner surface of the eyelid. Inflammation of this membrane, as seen here, is a common symptom of various eye conditions.

days before a rash appears). Fever peaks around the onset of the rash.

Initial symptoms

slide room on arrival.

MR vaccination rates have fallen in Wales. Rash and a temperature?